



PiC Indolor One Check
ciśnieniomierz naramienny



129⁹⁹

~~310⁹⁹~~

Medel Display Basic
automatyczny
ciśnieniomierz naramienny



97⁹⁹

~~169⁹⁹~~

Microlife FR 100
termometr skanujący
do czoła



89⁹⁹

~~129⁹⁹~~

Ołśniewająca biel
zdrowych zębów **BLANX**
www.blanx.info.pl

25⁹⁹
~~33⁹⁹~~

39⁹⁹
~~66⁹⁹~~

27⁹⁹
~~37⁹⁹~~

domowe laboratorium

12⁹⁹
~~21⁹⁹~~

14⁹⁹
~~24⁹⁹~~

21⁹⁹
~~36⁹⁹~~

15⁹⁹
~~25⁹⁹~~

Scholl

16⁹⁹
~~21⁹⁹~~

19⁹⁹
~~26⁹⁹~~

31⁹⁹
~~36⁹⁹~~

SUPER OFERTA!
ODOUR CONTROL SPRAY
50% GRATIS!

acerin dba o twoje stopy

11⁹⁹
~~15⁹⁹~~

11⁹⁹
~~15⁹⁹~~

Elgydium
przeciwpróchnicowa
pasta do zębów 75 ml
2 opakowania w cenie 1

10⁹⁹

~~26⁹⁹~~

2 za 1

Microlife Neb 100
inhalator tłokowy

104⁹⁹

~~166⁹⁹~~

Laboratoria Natury Żel Aloesowy
nawilżający do ciała 150 ml,
Mgielka Aloesowa
odświeżająca
do ciała i dekoltu
150 ml

17⁹⁹

~~28⁹⁹~~

Zdobytaj dodatkowe punkty LifeStyle!
infolinia: 0-801-543-300 (opłata jak za połączenie lokalne)

LifeStyle



Homeovox* tabletki stosowane przy chrypcie 60 szt.

Substancja czynna: Produkt ziołowy.
Postać: Tabletki powlekane.
Wskazania: Chrypka, nadrażnienie strun głosowych (mówienie, śpiewanie).
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podmiot odpowiedzialny: BOIRON SA 20 rue de la Liberation 69110 Ste-Foy-Lyon-Francia



11⁹⁹

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

~~14⁹⁹~~

Tantum Verde Forte 0,3%* aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 15 ml

Substancja czynna: Benzydamiini hydrochloridum.
Dawka: 3 mg / ml.
Postać: Aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle.
Wskazania: Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęki) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu błony śluzowej nosogardzieli, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii a także po intubacji.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze wchodzące w jego skład.
Podmiot odpowiedzialny: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy.
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Medagro International Sp. z o.o., Łazy, ul. Podlesna 83, 05-552, tel. (+48-22) 702-82-00.



Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

22⁹⁹

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

~~28⁹⁹~~

Ibalgin Maxi* tabletki przeciwbólowe 12 szt.

Substancja czynna: Ibuprofenum.
Dawka: 400 mg.
Postać: Tabletki.
Wskazania: Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (m.in. ból napięciowy i migrena), bóle zębów, bóle okolicy łędźwiowo-krzyżowej, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu.
Przeciwwskazania: Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ występowały objawy alergii w postaci nieżytu nosa, pokrzywki lub skurczu oskrzeli w wywiadzie; z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; perforacją lub lewaniem, również związanymi ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, stosujących jednocześnie inne leki z grupy NLPZ, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); w III trymestrze ciąży; ze skazą krwotoczną; z ciężką niewydolnością wątroby, nerek lub serca.
Podmiot odpowiedzialny: Zentiva a.s., informacji udziela: Sanofi-Aventis.



4⁹⁹

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

~~7⁹⁹~~

Nurofen dla dzieci Forte* przeciwbólowa i przeciwgorączkowa zawiesina doustna 50 ml

Substancja czynna: Ibuprofen.
Dawka: 5 ml preparatu zawiera 200 mg ibuprofenu.
Postać: Zawiesina doustna.
Wskazania: Gorączka różnego pochodzenia, bóle głowy, gardła mięśni w przebiegu zakażeń wirusowych, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego, bóle zębów, bóle na skutek ząbkowania.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku, na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Występujące w przeszłości po zaryzciu NLPZ objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, choroby wrzodowa żołądka, dwunastnicy, ciężka niewydolność nerek, wątroby, serca. Jednoczesne przyjmowanie innych NLPZ w tym inhibitory COX-2, III trymestrze ciąży, skaza krwotoczna.
Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.



16⁹⁹

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

~~20⁹⁹~~

Apap* tabletki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe 12 szt.

Substancja czynna: Paracetamol.
Dawka: 500 mg.
Postać: Tabletki powlekane.
Wskazania: Bóle różnego pochodzenia - ból głowy, mięśni, zębów, nerwobóle, bóle mieszkawkowe; gorączka, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy.
Przeciwwskazania: Uczulenie na paracetamol lub którykolwiek składnik leku, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, stosowanie inhibitorów MAO oraz w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu, występowanie wrodzonego niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej; stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.



4⁹⁹

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

~~6⁹⁹~~

Sudafed XyloSpray HA* aerozol udrażniająco zatkany nos, ułatwiający odpływ wydzieliny 10 ml

Dawka: Jeden ml roztworu Sudafed XyloSpray HA zawiera 1 mg ksylometazolinu chlorowodoru (Xylometazolinii hydrochloridum).
Postać: Aerozol do nosa, roztwór.
Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu błony śluzowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rinitis sicca); nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z oddzieleniem opony twardej; nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.



10⁹⁹

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

~~14⁹⁹~~

Voltaren Emulgel 1%* żel przeciwbólowy i przeciwzapalny 100 g

Substancja czynna: Diklofenak sodu.
Dawka: 10 mg/g.
Postać: Żel.
Wskazania: Preparat działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: porażonych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstających wskutek skręceń, nadwreżeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak zapalenie ścięgna, czy łokieć tenisisty), ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.



Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy.

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

22⁹⁹

~~42⁹⁹~~

Nurofen Forte 400 mg * przeciwbólowe i przeciwzapalne tabletki powlekane 24 szt.

Substancja czynna: Ibuprofen.
Dawka: 400 mg.
Postać: Tabletki powlekane.
Wskazania: Działania przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Do stosowania w bólach głowy, np. migrena, bólach okolicy krzyżowej, bólach zębów, np. po ekstrakcji zębów, nerwobolach, bólach mięśni i stawów, w bolesnym miesiączkowaniu, a także podczas gorączki w przebiegu grypy i przeziębienia.



Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen oraz inne NLPZ, objawy alergii po przyjęciu NLPZ, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; czynna lub przebiegająca choroba wrzodowa żołądka i/lub jelit; ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca; III trymestr ciąży; skaza krwotoczna.
Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

12⁹⁹

~~14⁹⁹~~

Urovitan Protect tabletki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych 60 szt.



24⁹⁹

~~47⁹⁹~~

suplement diety



LifeStyle

Płać mniej z kartą LifeStyle!
www.klublifestyle.pl



Lecithine 1200 Forte kapsułki stosowane w stanach napięcia nerwowego oraz jako profilaktyka cholesterolowa 48 szt.



12⁹⁹

suplement diety

Magnez + Vit B6 tabletki uzupełniające niedobór magnezu w organizmie 2 x 60 szt.



5⁹⁹

suplement diety

17⁹⁹
~~31⁹⁹~~

7⁹⁹
~~9⁹⁹~~

12⁹⁹
~~22⁹⁹~~

7⁹⁹
~~12⁹⁹~~

Domowa Apteczka Apetyt Stop
Tabletki ograniczające nadmierny apetyt
30 sztuk

Domowa Apteczka Apetyt Stop Max
Proszek do stosowania wraz z jogurtem lub wodą
Wspomaga odchudzanie, dając uczucie sytości
150 gram

Domowa Apteczka Glukozamina
Tabletki na sprawne stawy
50 sztuk

Domowa Apteczka Beta-Karoten Multi Plus
Tabletki na piękny oddech opalenizny i zdrową cerę
30 sztuk

5⁹⁹
~~12⁹⁹~~

12⁹⁹
~~22⁹⁹~~

7⁹⁹
~~12⁹⁹~~

suplementy diety

64⁹⁹
~~103⁹⁹~~

14⁹⁹
~~21⁹⁹~~

62⁹⁹
~~89⁹⁹~~

14⁹⁹
~~19⁹⁹~~

14⁹⁹
~~21⁹⁹~~

suplementy diety

18⁹⁹
~~24⁹⁹~~

15⁹⁹
~~25⁹⁹~~

11⁹⁹
~~18⁹⁹~~

suplementy diety

6⁹⁹
~~9⁹⁹~~

28⁹⁹
~~45⁹⁹~~

18⁹⁹
~~31⁹⁹~~

suplementy diety

5⁹⁹
~~7⁴⁹~~

6⁴⁹
~~9⁹⁹~~

6⁴⁹
~~9⁹⁹~~

suplementy diety

Mag B6 tabletki uzupełniające niedobór magnezu 60 szt.

7⁹⁹

13⁹⁹

suplement diety

Belissa tabletki wzmacniające i regenerujące skórę, włosy i paznokcie 50 szt.

cała seria -25%

7⁹⁹

suplement diety

Bobik K, Bobik DK kapsułki twist-off uzupełniające niedobór witamin u niemowląt 30 szt.

29⁹⁹

36⁹⁹

suplement diety

Zdobywaj dodatkowe punkty LifeStyle!
infolinia: 0-801-543-300 (opłata jak za połączenie lokalne)

LifeStyle



Przy zakupie kremów na odparzenia Sudocrem za minimum 40 zł IWOSTIN SOLECRIN SPF 50+ 50 ml krem ochronny **GRATIS**



GRATIS

ProBacti Dziecko proszek w saszetkach pomagający utrzymać prawidłową florę bakteryjną dziecka od 3 m-ca życia 10 szt.



12⁹⁹
~~17⁹⁹~~ suplement diety

Espumisan Easy saszetki z granulkami na wzdęcia 14 szt.



14⁹⁹
~~19⁹⁹~~ suplement diety

Hialeye nawilżające krople do oczu 0,4% 10 ml



16⁹⁹
~~33⁹⁹~~ ml

cięższe również: Hialeye krople do oczu 0,2% 10 ml

Senefol®* tabletki wskazane przy zaparciach 90 szt.

Substancja czynna: Liść i owoc senesu (Sennae folium cum fructus).
Dawka: 300 mg (jedna tabletką zawiera 7,5 mg antranołów w przeliczeniu na sennozdy B).
Postać: Tabletki.
Wskazania: Zaparcia.
Przeciwwskazania: Niedrożność i zwięźlenie jelit, atonia, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalne schorzenia jelit, bóle brzucha niewiadomego pochodzenia, stan odwodnienia połączony z utratą elektrolitów. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: LF Labofarm sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański.



11⁹⁹
~~14⁹⁹~~

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Lioton* żel stosowany wspomagająco w żylakach 30 g

Substancja czynna: Sól sodowa heparyny.
Dawka: 8,5 mg / g.
Postać: Żel.
Wskazania: Wspomagająco w żylakach kończyn dolnych, także w krwiakach, stłuczeniach, obrzękach oraz w zapobieganiu i leczeniu przerosłych żył oraz bliznowców.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki preparatu, skaza krwotoczna. Doustne przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. W okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
Podmiot odpowiedzialny: A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., 3 Via Sette Santi, 50131 Florencia, Włochy.



20⁹⁹
~~24⁹⁹~~

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

LINEA TABLETKI WSPOMAGAJĄCE ODCHUDZANIE RÓŻNE RODZAJE



19⁹⁹
~~31⁹⁹~~ Linea tabletki wspomagające odchudzanie 60 szt.

25⁹⁹
~~38⁹⁹~~ Linea 40+ tabletki wspomagające odchudzanie po 40 roku życia 60 szt.


25⁹⁹
~~38⁹⁹~~ Linea detox tabletki wspomagające odchudzanie u osób aktywnych 60 szt.

25⁹⁹
~~38⁹⁹~~ Linea fitness tabletki wspomagające odchudzanie u osób aktywnych 60 szt.

suplementy diety

Alli* kapsułki wspomagające odchudzanie 84 szt.

Substancja czynna: Orlistat.
Dawka: 60 mg.
Postać: Kapsułki twarde.
Wskazania: Alli jest przeznaczony dla osób z nadwagą, których wskaźnik masy (BMI) wynosi co najmniej 28 kg/m², a w obrębie tej grupy wyłącznie dla osób, które są gotowe przestrzegać niskokalorycznej diety o obniżonej zawartości tłuszczu.
Przeciwwskazania: Alli nie jest przeznaczony dla:
- osób poniżej 18 roku życia,
- kobiet w ciąży lub karmiących piersią,
- osób przyjmujących cyklosporynę,
- osób przyjmujących warfarynę lub inne doustne środki przeciwwrzepowe,
- osób z przewlekłym zespołem złego wchłaniania,
- osób cierpiących na cholestazę (zaburzenia przepływu żółci z wątroby),
- osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu Alli.
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.



114⁹⁹
~~179⁹⁹~~

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Claritine SPE* tabletki o działaniu przeciwalergicznym 7 szt.

Substancja czynna: Loratadynum.
Dawka: 10 mg.
Postać: Tabletki.
Wskazania: Claritine SPE wskazany jest w leczeniu objawów związanych z alergicznym nieżytym nosa takich jak kichanie, obrzęk błony śluzowej nosa, wyćiek z nosa, świąd i pieczenie oczu. Produkt Claritine SPE jest również wskazany w leczeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość lub idiosynkrazia na substancję czynną (loratadynę) lub na którykolwiek składnik pomocniczy. Nie stosować produktu w okresie ciąży. Nie stosować produktu u dzieci poniżej 2 roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: Schering-Plough Labo N.V.



849
~~1549~~

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Calcium z Vit C, Calcium w folii tabletki musujące stosowane w stanach przeziębienia i alergii 2 x 12 szt.



399
~~999~~ suplement diety

2x1

Fructolax kostki do żucia stosowane przy skłonnościach do zaparć oraz przy zaburzeniach powstałych na tle niewłaściwego odżywiania 12 szt.



1999
~~3199~~ suplement diety

LifeStyle

LifeStyle SUPER-PHARM APTEKA



Diohespan Max* tabletki stosowane przy uczuciu ciężkości nóg, bólach nóg 30 szt.

Substancja czynna: Diosminum.
Dawka: 1000 mg.
Postać: Tabletki.
Wskazania: Zmniejszenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych: uczucie ciężkości nóg, bóle, odleżyny z powodu niedokrwienia, miejscowe zaczerwienienie nóg. Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żyłkami odbytu (hemoroidy).
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na diosminę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Cięża lub przysuszczenie ciąży, karmienie piersią. Lek ten może być stosowany w czasie ciąży jedynie, jeżeli jest to konieczne oraz wyłącznie za zgodą lekarza. W związku z tym, że brak jest danych na temat przenikalności leku do mleka matki, leczenie nie jest zalecane w czasie karmienia piersią.



Podmiot odpowiedzialny: Aiofarm
 Fabryka Leków Sp. z o.o. 95-054
 Ksawerów, ul. Szkolna 31.

25⁹⁹

~~36⁹⁹~~

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Smecta* proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Leczenie ostrej i przewlekłej biegunki u dorosłych i dzieci 10 szt.

Substancja czynna: Diosmektyl (glinokrzemian).
Dawka: 3 g.
Postać: Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.
Wskazania: Leczenie ostrej i przewlekłej biegunki u dorosłych i dzieci.
Przeciwwskazania: Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i (lub) galaktozy, lub z niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.
Podmiot odpowiedzialny: Beauflour Ipsen Pharma, 24 rue Erlanger, 75016 Paryż, Francja.
 Informacji o leku udziela: UCB Pharma Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, tel. + 48 (0) 22 696 99 20.



PL/LPSRC/SME/121/2009/05

11⁹⁹

~~18⁹⁹~~

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Bengay* maść przeciwbólowa 50 g

Substancja czynna: Methylis salicylas + Mentholum.
Dawka: (150 mg + 100 mg)/g.
Postać: Maść.
Wskazania: Bengay maść przeciwbólowa przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat i wskazana w celu łagodzenia: - bólów i sztywności mięśni oraz stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym, - bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na salicylan metyli, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; nie stosować na podrażnioną skórę i otwarte rany; nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.



11⁹⁹

~~17⁹⁹~~

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Fenistil* żel łagodzący podrażnienia skóry 30 g

Substancja czynna: Maleinian dimetydenu.
Dawka: 1 mg/g.
Postać: Żel.
Wskazania: Świąd towarzyszący dermatozom, pokrzywka, ukąszenia owadów, oparzenia słoneczne, powierzchniowe oparzenia skóry (słonecznego stopnia).
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu leczniczego, oparzenia drugiego i trzeciego stopnia.
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy.



18⁹⁹

~~23⁹⁹~~

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Activeblock Classic, Sensitive
 Antyperspiranty
 zapobiegający nadmiernej
 potliwości 25 ml



32⁹⁹

~~42⁹⁹~~

Lokomotiv
 pastylki, drażetki, syrop
 stosowane przy zagrożeniu
 wystąpienia choroby
 lokomocyjnej różne rodzaje



-30%

suplement diety

Ompeed®
 Natychmiastowa
 ulga w bólu

- Plastry na odciski między palcami 10 szt.
- Plastry na odciski na palcach 10 szt.
- Plastry na pęcherze wąskie 6 szt.
- Plastry na pęcherze średnie 5 szt.
- Szyfl przeciw pęcherzom 8 ml
- Plastry na pęcherze Extreme 5 szt.



13⁹⁹
~~15⁹⁹~~

13⁹⁹
~~18⁹⁹~~

15⁹⁹
~~18⁹⁹~~

Matopat Tattoo, Happy Tattoo
 plastry opatrunkowe
 dla dzieci 12 szt.



cena z kartą
 LifeStyle
 -35%

PiC Indolor
 zestaw żelu antybakteryjnego 80 ml
 + chusteczki nawilżone 20 szt.



cena z kartą
 LifeStyle
 9⁹⁹

~~17⁹⁹~~

Perspiblock
 tabletki hamujące nadmierne
 wydzielanie potu 30 szt.



cena z kartą
 LifeStyle
 10⁹⁹

~~14⁹⁹~~

suplement diety

Zdobytaj dodatkowe punkty LifeStyle!
 infolinia: 0-801-543-300 (opłata jak za połączenie lokalne)

LifeStyle



LATO MIŁOŚCI

UNIMIL SOBIE ŻYCIE

cała seria -20%

UNIMIL żele intymne 75 ml

UNIMIL Aphrodisiac żel do masażu 200 ml

UNIMIL Luscious żel do masażu 200 ml

UNIMIL prezerwatywy różne rodzaje 3 szt.

UNIMIL Variety, SKYN, Max Love, Contact, UltraSafe

UNIMIL Personal Pleasure Touch nakładka wibracyjna na palec

UNIMIL Pleasure Vibes nakładka wibracyjna 3 przelotki

Vita-min Kapsułki dla kobiet uzupełniające zapotrzebowanie organizmu na witaminy i składniki mineralne 30 szt. **13⁹⁹ / 17⁹⁹**

LACIBIOS Femina kapsułki zmniejszające ryzyko infekcji podwojny 10 szt. **17⁹⁹ / 25⁹⁹**

DAKOLEN tabletki poprawiające jędrność piersi 40 szt. **59⁹⁹ / 84⁹⁹**

ASEQUIRELLA tabletki stosowane osłonowo przy antykoncepcji hormonalnej 20 szt. **9⁹⁹ / 13⁹⁹**

OLIMP EREKTON kapsułki stosowane przy zaburzeniach erekcji 30 szt. **29⁹⁹ / 39⁹⁹**

PERMEN tabletki dla mężczyzn pozwalające utrzymać sprawność seksualną oraz doskonałą formę fizyczną i vitalność 30 szt. **51⁹⁹ / 84⁹⁹**

VIGOR PLUS tabletki z witaminami korzystnie wpływające na sprawność intelektualną i fizyczną 60 szt. **32⁹⁹ / 42⁹⁹**

LATO MIŁOŚCI z DUREX

cała seria -20%*

DUREX prezerwatywy różne rodzaje 3 szt.

DUREX PLAY O żel dla kobiet 15 ml

DUREX PLAY nakładka wibracyjna

DUREX PLAY z Guaranną żel do masażu 2w1 200 ml

DUREX PLAY z Ylang Ylang żel do masażu 2w1 200 ml

DUREX PLAY żele do masażu 50 ml

* nie dotyczy zestawów

www.superpharm.pl

BIALYSTOK • Galeria Biała • **BYDGOSZCZ** • Focus Park • **BYTOM** • Agora • **CZĘSTOCHOWA** • Galeria Jurajska • **GDĄSK** • Matarnia Park Handlowy •
 Galeria Bałtycka • **KATOWICE** • Silesia City Center • **KRAKÓW** • Galeria Kazimierz • **ŁÓDŹ** • Manufaktura • Port Łódź • **OPOLE** • Ziemiowit • Centrum Handlowe Turawa •
POZNAN • Galeria Malta • King Cross Marcellin • Stary Browar • **SZCZECIN** • Galaxy Center • Turzyn • **TORUŃ** • Czerwona Droga 1/6 • **WARSZAWA** • Galeria Mokotów
 • Blue City • Arkadia • Promenada • Złote Tarasy • Belgradzka • **WROCŁAW** • Park Handlowy Bielany • Centrum Handlowe Magnolia • Park Handlowy Młyn • Oławska •

1) Super-Pharm zastrzega sobie prawo do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych produktów dla jednego Klienta. 2) Promocji nie można ze sobą łączyć. 3) Czas promocji ograniczony. Promocja ważna do wyczerpania zapasów. 4) Ceny zawierają podatek VAT. 5) Folder zawiera ceny za sztukę lub zestaw. 6) Super-Pharm nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia umieszczone w folderze mogą odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży.